病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
大腸癌	FOLFOX-4	オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
	（入院）	レボホリナート	100ｍｇ/㎡	D1,D2		●	●												終																					
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1,D2 （全開投与）	2週毎	●	●												終																					
		フルオロウラシル	600ｍｇ/㎡	D1～22時間持続 D2～22時間持続		●	●												終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●											終																					
大腸癌	FOLFOX-4+Bev	アバスチン	5or10ｍｇ/ｋｇ	D1		●													終																					
	（入院）	オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
		レボホリナート	100ｍｇ/㎡	D1,D2		●	●												終																					
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1,D2 （全開投与）	2週毎	●	●												終																					
		フルオロウラシル	600ｍｇ/㎡	D1～22時間持続 D2～22時間持続		●	●												終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●											終																					
大腸癌	FOLFOX-4+P-mab	ベクティビクス	6ｍｇ/ｋｇ	D1		●													終																					
	（入院）	オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
		レボホリナート	100ｍｇ/㎡	D1,D2		●	●												終																					
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1,D2 （全開投与）	2週毎	●	●												終																					
		フルオロウラシル	600ｍｇ/㎡	D1～22時間持続 D2～22時間持続		●	●												終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●											終																					
大腸癌	mFOLFOXIRI+Bev	アバスチン	5ｍｇ/ｋｇ	D1		●													終																					
	（入院）	イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
		オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2~23時間持続	2週毎	●	●												終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●											終																					
大腸癌	m5-FU+LV+Be v 維持（入院）	アバスチン	5ｍｇ/ｋｇ	D1		●													終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●													終																					
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2~23時間持続		●	●												終																					
大腸癌	mFOLFOX-6+Bev	アバスチン	5or10ｍｇ/ｋｇ	D1		●													終																					
	（入院）	オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●													終																					
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●													終																					
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2～23時間持続		●	●												終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●											終																					
大腸癌	XELOX	オキサリプラチン	130ｍｇ/㎡	D1		●																				終														
		カペシタビン	1.36㎡未満：2400ｍｇ/day 1.36～1.66㎡未満：3000ｍｇ/day	D1夕～D15朝			●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終													

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		カペシタビン	1.66㎡～1.96㎡未満：3600ｍｇ/day 1.96㎡以上：4200ｍｇ/day	D1夕～D15朝	3週毎	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終															
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●																	終															
大腸癌	XELOX+Bev	アバスチン	7.5ｍｇ/ｋｇ	D１		●																			終															
		オキサリプラチン	130ｍｇ/㎡	D1		●																			終															
		カペシタビン	1.36㎡未満：2400ｍｇ/day 1.36～1.66㎡未満：3000ｍｇ/day 1.66㎡～1.96㎡未満：3600ｍｇ/day 1.96㎡以上：4200ｍｇ/day	D1夕～D15朝	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終															
						●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終															
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●																	終															
大腸癌	アバスチン +ゼローダ	アバスチン	7.5ｍｇ/ｋｇ	D１		●																			終															
		カペシタビン	1.36㎡未満：2400ｍｇ/day 1.36～1.66㎡未満：3000ｍｇ/day 1.66㎡～1.96㎡未満：3600ｍｇ/day 1.96㎡以上：4200ｍｇ/day	D1夕～D15朝	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終															
						●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終															
大腸癌	アバスチン +ロンサーフ	アバスチン	5ｍｇ/ｋｇ	D1,D15		●														●朝						終															
		ロンサーフ	単位（ｍ） ：（ｍｇ/day） 1.07（㎡）未満：70（ｍｇ/day） 1.07～1.23未満：80 1.23～1.38未満：90 1.38～1.53未満：100 1.53～1.69未満：110 1.69～1.84未満：120 1.84～1.99未満：130 1.99～2.15未満：140 2.15以上：150	D1～D5, D8～D12 （５投9休） ※D1~D15, D15～D19	4週毎	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●													終												
大腸癌	SOX	オキサリプラチン	130ｍｇ/㎡	D1		●																			終															
		S-1	1.25㎡未満：80ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：100ｍｇ/day 1.5㎡以上：120ｍｇ/day	D1夕～D15朝	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終															
						●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終															
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●																	終															
大腸癌	SOX+Bev	アバスチン	7.5ｍｇ/ｋｇ	D１		●																																	
		オキサリプラチン	130ｍｇ/㎡	D1		●																																	
		S-1	1.25㎡未満：80ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：100ｍｇ/day 1.5㎡以上：120ｍｇ/day	D1夕～D15朝	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終															
						●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終															
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●																	終															
大腸癌	FOLFIRI （入院）	レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																				

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
					2週毎																																				
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2～23時間持続		●	●													終																				
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																				
大腸癌	FOLFIRI+Bev	アバスチン	5or10ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																				
	（入院）	レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																				
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2～23時間持続		●	●													終																				
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																				
大腸癌	FOLFIRI+Pmab	ベクティビクス	6ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																				
	（入院）	レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																				
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2～23時間持続		●	●													終																				
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																				
大腸癌	FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																				
	（入院）	レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																				
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2～23時間持続		●	●													終																				
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート ボララミン		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																				
大腸癌	SIR	イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																				
		S-1	1.25㎡未満：80ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：100ｍｇ/day 1.5㎡以上：120ｍｇ/day	D1夕～D15朝	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終														
						●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終														
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●														終																				
大腸癌	SIRB	アバスチン	7.5ｍｇ/ｋｇ	D１		●																				終														
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●																				終														
		S-1	1.25㎡未満：80ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：100ｍｇ/day 1.5㎡以上：120ｍｇ/day	D1夕～D15朝	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終														
						●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終														
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●																				終														
大腸癌	ベクティビクス単独	ベクティビクス	6ｍｇ/ｋｇ	D1	2週毎	●														終																				
大腸癌	CPT-11　隔週	イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																				
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																				
大腸癌	CPT-11 +ベクティビクス	ベクティビクス	6ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																				
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																				

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																				
局所 進行直腸癌	術前CRT S-1+CPT-11	イリノテカン	80ｍｇ/㎡	D1,D8,D22,D29		●							●														●							●						
		S-1	1.25㎡未満：80ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：100ｍｇ/day 1.5㎡以上：120ｍｇ/day	D1～D5 D8～D12 D22~D26 D29~D33	５週１クールのみ	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●											●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			
		放射線併用		１週（5日間） ～５週目まで。		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●																																
大腸癌	FOLFIRI ｲﾝﾌｭｰｻﾞ-ポンプ	レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																			
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																			
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																			
大腸癌	FOLFIRI+Bev ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	アバスチン	5or10ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																			
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																			
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																			
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																			
大腸癌	FOLFIRI+Pmab ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	ベクティビクス	6ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																			
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																			
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																			
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																			
大腸癌	FOLFIRI+RAM ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	サイラムザ	8ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																			
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																			
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																			
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート ボララミン		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																			
大腸癌	mFOLFOX-6 ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																			
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																			
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ボララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																			
大腸癌	mFOLFOX-6 （入院）	オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																			
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																			

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																					
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																					
大腸癌	mFOLFOX-6 +P-mab	ベクティビクス	6ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																					
	ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1 （全開投与）	2週毎	●														終																					
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																					
大腸癌	mFOLFOXIRI+Bev	アバスチン	5ｍｇ/ｋｇ	D1		●														終																					
	ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																					
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																					
大腸癌	m5-FU+LV+Be v 維持	アバスチン	5ｍｇ/ｋｇ	D1	2週毎	●														終																					
	ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続			●	●												終																					