病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
胆管癌	GS	ジェムザール	1000ｍｇ/㎡	D1,D8		●																				終															
		S-1	1.25㎡未満：60ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：80ｍｇ/day 1.5㎡以上：100ｍｇ/day	D1~D14	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終															
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕							終															
		(d.i.v)デキサート		D1,D8		●																				終															
膵・胆管癌	GEM	ジェムザール	1000ｍｇ/㎡	D1,D8,D15	4週毎	●							●							●													終								
		(d.i.v)デキサート		D1,D8,D15		●							●							●													終								
膵癌	アブラキサン +ジェムザール	アブラキサン	125ｍｇ/㎡	D1,D8,D15	4週毎	●							●							●													終								
		ジェムザール	1000ｍｇ/㎡	D1,D8,D15		●							●							●													終								
		(d.i.v) アロキシ、デキサート		D1,D8,D15		●							●							●													終								
膵癌	FOLFIRINOX （入院）	イリノテカン	180ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																					
		オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2~23時間持続		●	●													終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																					
膵癌	FOLFIRINOX ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	イリノテカン	180ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																					
		オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	400ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																					
膵癌	mFOLFIRINOX ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																					
		オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続		●	●													終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																					
膵癌	mFOLFIRINOX （入院）	イリノテカン	150ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																					
		オキサリプラチン	85ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	1200ｍｇ/㎡	D1～23時間持続 D2~23時間持続		●	●													終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、ガスター、ポララミン、デキサート		D１～D3 点滴は全てD１		●	●	●												終																					
胆管癌	GC	シスプラチン	25ｍｇ/㎡	D1,D8	3週毎	●							●													終															
		ジェムザール	1000ｍｇ/㎡	D1,D8		●							●													終															
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 D1,D8		●	●	●					●													終															
膵癌	（NAC）S-1+GEM	ジェムザール	1000ｍｇ/㎡	D1,D8	3週毎	●							●													終															
		S-1	1.25㎡未満：80ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：100ｍｇ/day 1.5㎡以上：120ｍｇ/day	D1夕～D15朝			●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終															
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕							終															
		(d.i.v)デキサート		D1,D8		●							●													終															
胆管癌	GCS	シスプラチン	25ｍｇ/㎡	D1	2週毎	●														終																					
		ジェムザール	1000ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		S-1	1.25㎡未満：80ｍｇ/day 1.25～1.5㎡未満：100ｍｇ/day 1.5㎡以上：120ｍｇ/day	D1夕～D8朝			●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝								終																					
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕								終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 D1		●	●	●												終																					

病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
膵癌	nal-IRI+5-FU/LV	オニバイド	70ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
	ｲﾝﾌｭｰｻﾞ ポンプ	レボホリナート	200ｍｇ/㎡	D1		●														終																					
		フルオロウラシル	2400ｍｇ/㎡	D1～46時間持続	2週毎	●														終																					
		（p.o）アプレピタント (d.i.v)アロキシ、デキサート		D１～D3 点滴は全てＤ１		●	●	●												終																					