| 登録番号 | 病名 | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1コース日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-002 | 非ホジキンリンパ腫 | R-CHOP療法 | リツキサン | 375 mg/m$^2$ | D1 | 3週毎 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ドキソルビシン | 50 mg/m$^2$ | D1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | オンコビン | 1.4 mg/m$^2$ | D1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | エンドキサン | 750 mg/m$^2$ | D1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (d.i.v) パロノセトロン<br>(p.o) レスタミン錠<br>カロナール錠 | 0.75 mg<br>10 mg 5錠<br>200 mg 2錠 | D1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (p.o) アプレピタント | | D1-D3 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | 終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (p.o) プレドニン錠 | 5 mg 20錠 分2朝夕 | D1-D5 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 終 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |